

УПОТРЕБА / PËRDORIMI

Novalac 3 е млечна формула наменета за мали деца од 1 до 3 години со додадени витамини и минерали. Подготвениот оброк во едно шише Novalac 3 млечна формула содржи калциум и витамин Д (потребни за нормален раст и развој на коските кај децата), железо (придоносуча за нормален когнитивен развој) кај децата и јод (придоносуча за нормален раст кај децата). Novalac 3 е извор на витамините А, Б1, Б2, Ц, Д и биотин, исто така е богат и со витамини Б12 и К1. Novalac 3 млечната формула е погодна за продолжување со исхрана по употребата на Novalac 2 или некоја друга млечна формула. Има добар вкус на ванила. / Novalac 3 paraqet një formulë qumështore e paraparë për fëmijë të vegjël të moshave 1 deri në 3 vjeç me vitamina dhe minerale të shtuara. Vakti i përgatitur në një shishe me formulë të qumështit Novalac 3 përmban kalcium dhe vitaminë D (të nevojshme për rritjen normale dhe zhvillimin e eshtrave tek fëmijët), hekur (kontribuon në zhvillimin normal kognitiv të fëmijëve) dhe jod (kontribuon në rritjen normale të fëmijëve). Novalac 3 është burim i vitaminave A, B1, B2, C, D dhe biotinës, gjithashtu është i pasur me vitamina B12 dhe K1. Formula qumështore Novalac 3 është e përshtatshme për vazhdimin e ushqyerjes pas përdorimit të Novalac 2 ose të ndonjë formulë qumështore tjetër. Ka një shije të mirë vanilje.

ДОЗИРАЊЕ / DOZIMI

На вашето дете можете да му дадете топла (<37°C) или ладна млечна формула Novalac 3, или да ја употребите за подготовка на детски житарици и други оброци како дел од урамнотежената исхрана. Една лименка од 400 g е доволна за подготовка на 11 оброци. Подготовка во шише: На секој 30 ml вода додадете 1 дозерка Novalac 3. Една дозерка содржи 4,5 g Novalac 3. За 100 ml оброк додадете 3 до раб израмнети дозерки (15 g). Подготовка во чаша: Во 240 ml вода додадете 8 дозерки Novalac 3. / Ju mund t'i jepni fëmijës suaj formulë qumështore Novalac 3 të ngrohtë (<37°C) ose të ftohtë, ose ta përdorni për të përgatitur drithëra për fëmijë dhe vakte të tjera si pjesë e një diete të ekuilibruar. Një kanace prej 400 g është e mjaftueshme për të përgatitur 11 vakte. Përgatitja në shishe: Në çdo 30 ml ujë shtoni 1 lugë matëse Novalac 3. Një lugë matëse përmban 4,5 g Novalac 3. Për 100 ml ushqim shtoni tre lugë matëse të niveluara deri në skaj (15 g). Përgatitja në gotë: Shtoni 8 lugë matëse Novalac 3 në 240 ml ujë.

- Сегораш подгответе свеж оброк. / Përgatitni gjithmonë një vakt të freskët.
- Чувajte на суво место, заштитено од светлина и топлина. / Ruadjeni në një vend të thatë, të mbrojtur nga drita dhe nxehtësia.
- Не го употребувајте после истекот на рокот на употреба втиснат на дното на лименката. / Mos e përdorni pas datës së skadencës të shtypur në fund të kanacës.
- После првото отворање на лименката содржината употребете ја во рок од 3 недели. / Pas hapjes së parë të kanacës, përdorni përmbajtjen brenda 3 javësh.
- После секоја употреба на лименката добро затворете ја. / Mbyllni kutin metalike fort pas çdo përdorimi.
- Не го чувajte неиспиениот оброк. Фрлете го остатокот. Пакувано во контролирана атмосфера. / Mos e ruani qumështin e mbetur. Hidhni pjesën tjetër. E paketuar në atmosferë të kontrolluar.

Производител: UP INDUSTRIES, Heerener str.49, 39576 Stendal, Германија за UP Medi-Europa SA Швајцарија. Земја на потекло: Германија. Увезено од Словенија. Застапник: Медис Македонија ДООЕЛ Скопје.

Prodhuues: UP INDUSTRIES, Heerener str.49, 39576 Stendal, Gjermani për UP Medi-Europa SA Zvicër. Vendi i origjinës: Gjermania. E importuar nga Sllovenia. Përfaqësues: Medis Makedonija DООЕЛ Shkup

MEDIS | www.novalac.mk



Novalac

3

Диететски производ
Млечна формула за мали деца
Produkt dietik
Formulë qumështore për fëmijë
të vegjël



1-3

 години / вјеç

400 g e

Хранлива вредност / Vlerat ushqyese

Енергетска вредност / Vlera energjetike	100 ml	100 ml
	kcal	269
Маси , од кои / <i>Yndytja</i> , prej të cilave:	g	19
- заситени масни киселини / <i>yndytja të ngopura</i>	g	7,6
- липоина киселина / <i>acid linoleik</i>	g	4,4
- алфа липоленска киселина / <i>alfa-acid linoleik</i>	mg	530
Јаглехидрати , од кои /		
Karbohidrate , nga të cilat:	g	64,4
- шеќери / <i>sheqerna</i>	g	38,2
Протеини / <i>Proteina</i>	g	11
Соли / <i>Kripëra</i>	g	0,325
Витамини / <i>Vitamina</i>		
A	µg	540
D / D	µg	8,5
E	mg	4
K	µg	30
C / C	mg	60
Тиамин / <i>Tiaminë</i>	mg	0,6
Рибофлавин / <i>Riboflavinë</i>	mg	1
Ниацин / <i>Niacinë</i>	mg	6
B6 / B6	mg	0,7
Фолна киселина / <i>Acid folik</i>	µg	120
B12 / B12	µg	2
Биотин / <i>Biotinë</i>	µg	20
Пантотенска киселина / <i>Acid pantotenik</i>	mg	2,5
Минерали / <i>Minerale</i>		
Калциум / <i>Kalium</i>	mg	650
Фосфор / <i>Fosfor</i>	mg	385
Магнезиум / <i>Magnez</i>	mg	45
Железо / <i>Hekur</i>	mg	9,5
Цинк / <i>Zink</i>	mg	4
Бакар / <i>Bakër</i>	mg	0,35
Манган / <i>Mangan</i>	mg	0,035
Јод / <i>Jod</i>	µg	100

СОСТАВ / PËRBËRJA

Делумно обезмастено **млеко**, малтодекстрин, лактоза (**млеко**), растителни масла (палимно, соино, кокосово, масло од репка), фруктоза, декстроза, трикалциум цитрат, трикалциум фосфат, витамини [аскорбинска киселина (витамин Ц), никотинамид (ниацин), ДЛ-алфа-токоферил ацетат (витамин Е), калциум-Д-пантотенат, рибофлавин, тиамин хидрохлорид, ретинил-ацетат (витамин А), пиридоксин хидрохлорид (витамин Б6), фолна киселина, Д-биотин, фитоменадион (витамин К), колекалциферол (витамин Д), цијанокобаламин (витамин Б12)], етил-ванилин, жељезо сулфат, магнезиум оксид, цинк сулфат, антиоксиданси (екстракти богати со токоферол), бакар сулфат, калциум јодид, манган сулфат. / **Qumësht** pjesërisht i skretuar, maltodekstrinë, laktozë (**qumësht**), vajra vegetale (palme, soje, kokosi, vaj rapsi), fruktazë, dektrazë, citrat trikalciumi, fosfat trikalciumi, vitamina (acid ascorbik (vitaminë C), nikotinamid (niacina), DL-alfa-tokoferil acetat (vitaminë E), kalcium-D-pantotenat, riboflavinë, hidroklorur tiaminë, retinil acetat (vitaminë A), hidroklorur i piridoksinës (vitaminë B6), acid folik, D-biotinë, fitomenadion (vitaminë K), kolekalcefrol (vitaminë D), cianokobalaminë (vitaminë B12)), etil vanilinë, sulfat hekur, oksid magnez, sulfat zinku, antioksidantë (ekstrakte të pasura me tokoferole), sulfat bakri, jodur kaliumi, sulfat mangani.

Упатство за подготовка / Mënyra e përgatitjes



ПРЕД ПОДГОТОВКА НА СЕКОЈ ОБРОК ИЗМИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ. / LANI GJITHMONË DUART PËRPARA SE TË PËRGATISNI NJË SHISHE ME QUMËSH.



1 Шишенцето и цуцлата со капачето превријте ги во вода. Нека вријат барем 5 минути. / Zieni shishen dhe biberonin me kapak në ujë. Lërimi të ziejnë për të paktën 5 minuta.



2 Водата за подготвување на оброкот превријте ја во покриен сад. Нека врие барем 5 минути. / Zieni ujin për përgatitjen e vaktit në një enë të mbyllur. Lërimi të ziejë për të paktën 5 minuta.



3 Водата во садот опладете ја на 40°C и ставете ја во шишенцето. / Ujin në enë lërimi të ftohe deri në 40°C dhe vendoseni në shishe.



4 Ставете го пропорцијат број на дозерки во шишето со помош на приложената дозерка. / Vendosni numrin e përkthuar të lugëve matëse në shishe duke përdorur lugën e dhënë.



5 Затворете го шишето и добро промешајте за прашокот потполно да се раствори. / Mbyllni shishën dhe përzieni mirë në mënyrë që pluhuri të tretet plotësisht.



6 Подготвениот оброк опладете го до млако (37°C) односно додека на кожата не осетите ни ладно ни топло. / Ftohni ushqimin e përgatitur derisa të jetë i vaktë (37°C), derisa të mos ndjeni as të ftohtë e as të nxehtë në lëkurë.